DLP 29-4-87014856

Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-57

GRANDES CULTURES SEMENCES

N° 2 - 23 MARS 1987

S P E C I A L   C O L Z A


(en collaboration avec les SUAD du Gard et de l'Hérault
et les Sociétés Coopératives Agricoles SUD-CEREALES et de BARJAC)

MELIGETHE : - CAPTURES INTENSES LOCALEMENT
- LES COLZAS LES PLUS AVANCES SONT AUX STADES SENSIBLES D1 À F1

CHARANÇON DE LA TIGE :
- CAPTURES IMPORTANTES SECTORIELLEMENT
- LA MAJORITÉ DES COLZAS SONT AUX STADES SENSIBLES C1 À T20



Méligèthe
longueur 2-3 mm



Chanrançon de la tige
longueur 3-4 mm

Les niveaux de captures se maintiennent tant pour le charançon de la tige que pour le méligèthe tout particulièrement dans les secteurs de St Nazaire, Brouzet les Alès, Barjac, Uzès).

.../...

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42

SPV

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Le Directeur, M. FREYDIER - N° d'inscription 531 AD

P15

Surveillez vos cultures, notamment celles situées à proximité de parcelles ayant eu du colza en 1986.

Réalisez un traitement dès que :

1) **MELIGETHES** :

vous comptez : 1 insecte par inflorescence : stades D1 à E
2-3 insectes par inflorescence : stades E à F1.



Stade D1

boutons racolés encore cachés par les feuilles



Stade E

(boutons écartés)

2) **CHARANCON DE LA TIGE** :

- les captures sont supérieures à 10 par jour (ou 40 à 50 pendant une période de 4 à 5 jours)

- ou lorsque vous observez une ponte par tige en moyenne sur 50 plants entre C1 et tige 20 cm.

Passé ce dernier stade toute intervention et inutile contre ce ravageur.

LES PRODUITS DE TRAITEMENT :

- VOUS REPORTER A LA FICHE RAVAGEURS DU COLZA JOINTE AU 1ER BULLETIN.

- PENDANT LA FLORAISON, N'UTILISEZ QUE DES SPECIALITES NON DANGEREUSES PAR LES ABEILLES.